# Aminoforte® F

REGISTRO Q-0616-044

Fuente de electrolitos, glucosa, vitaminas, agua y aminoácidos en alta concentración

**Solución Inyectable**

USO VETERINARIO

**Formulación**

Cada 100 ml contiene:

| | |
|---|---|
| Dextrosa | 5 g |
| Cloruro de calcio | 15 mg |
| Cloruro de potasio | 20 mg |
| Sulfato de magnesio | 20 mg |
| Acetato de sodio 3H2O | 250 mg |
| L-Histidina (como clorhidrato) | 27.5 mg |
| DL- Metionina | 34 mg |
| DL-Triptófano | 34 mg |
| L-Cisteina (como clorhidrato) | 26.1 mg |
| L- Treonina | 68 mg |
| DL-Isoleucina | 68 mg |
| L-Arginina (como clorhidrato) | 70.3 mg |
| DL-Fenilalanina | 102 mg |
| DL-Valina | 170 mg |
| L-Lisina (como clorhidrato) | 81.6 mg |
| L-Leucina | 136 mg |
| Glutamato monosódico | 136 mg |
| Vit. $B_1$ (Tiamina HCl) | 8.9 mg |
| Vit. $B_2$ (Riboflavina 5 Fosfato) | 2.9 mg |
| Vit. $B_6$(Piridoxina HCl) | 8.2 mg |
| Vit. $B_{12}$ (Cianocobalamina) | 5 mcg |
| Nicotinamida | 150 mg |
| Excipientes c.b.p. | 100 mL |

**Fórmula Garantizada**

Cada 100 ml contiene:

| | |
|---|---|
| Vitamina $B_1$ (Tiamina HCl) | 8.9 mg |
| Vitamina $B_2$ (Riboflavina 5 fosfato) | 2.9 mg |
| Nicotinamida | 150 mg |
| Vitamina $B_6$ (Piridoxina HCl) | 8.2 mg |
| Vitamina $B_{12}$ (Cianocobalamina) | 0.005 mg |
| Nitrógenos totales | 168.05 mg |
| Dextrosa | 5000 mg |
| Sodio | 60.92 mg |
| Calcio | 4.09 mg |
| Magnesio | 4.04 mg |
| Potasio | 10.49 mg |
| Excipientes c.b.p. | 100 mL |

**Propiedades**

**Aminoforte® F** es una solución inyectable acuosa estéril de alta concentración que constituye una fuente adecuada de aminoácidos, electrolitos, vitaminas y azúcares que restaura el equilibrio vital necesario para recuperar a los animales en situaciones de emergencia.

**Aminoforte® F** contiene diez aminoácidos esenciales descritos para la nutrición animal, además de presentar ácido glutámico y cisteína. En rumiantes, los microorganismos del rumen son capaces de sintetizar tales moléculas aunque es necesario un aporte de tales sustancias para conseguir los máximos ritmos de crecimiento o de producción de leche.

Las vitaminas del complejo B y la nicotinamida; son vitaminas hidrosolubles que no se retienen en el organismo en cantidades apreciables, por lo que resulta necesario un aporte exógeno, principalmente cuando existen situaciones fisiológicas o patológicas especiales. Estas vitaminas intervienen en innumerables funciones

metabólicas, participan en el correcto funcionamiento del sistema nervioso y resultan esenciales para la producción de glóbulos rojos y para la síntesis de ADN. Tal y como ocurre con los aminoácidos esenciales, los microorganismos presentes en el rumen son capaces de sintetizar estas vitaminas en cantidades adecuadas para el metabolismo normal del hospedador y para una concentración adecuada en la leche; a pesar de ello, en ciertas condiciones, pueden producirse deficiencias en tiamina y cianocobalamina.

Los electrolitos presentes en **Aminoforte® F** proporcionan al organismo los elementos que se pierden con mayor facilidad en los periodos de deshidratación. La glucosa es la fuente de energía básica y de rápida utilización, por ello su administración por vía parenteral, en forma de solución, constituye un aporte de energía fundamental en estados carenciales y/o patológicos en los que la ingesta oral se halla disminuída o impedida.

**Indicaciones**
Como fuente inmediata de aminoácidos, dextrosa, vitaminas del complejo B y electrolitos para el tratamiento de estados agudos de convalecencia de animales debilitados o sometidos a esfuerzos intensos, stress, shock, deshidratación, enfermedades crónicas, parasitosis y como terapia de apoyo en casos de deshidratación severa por vómitos o diarreas donde ayude a reponer la pérdida de electrolitos y proteínas (en este caso es necesario además la fluidoterapia oral o parenteral).

**Dosis y Vía de Administración**
Se aconseja la administración de 1 mL por cada 5 kg de peso vivo, entre 1 y 3 veces al día, según la gravedad del caso y criterio facultativo. Se puede realizar la administración por vía intravenosa, intramuscular, subcutánea o intraperitoneal en bovinos, camélidos, ovinos, porcinos, caninos y felinos; en equinos se recomienda utilizar únicamente la vía intravenosa.

La administración de **Aminoforte® F** no excluye el tratamiento específico del estado patológico que afecte al animal.

**Especies de Destino**
Bovinos (carne y leche), ovinos, porcinos, equinos, caninos y felinos.

**Tiempo de Retiro**
No presenta periodo de retiro.

**Contraindicaciones**
- No se han descrito contraindicaciones durante la preñez y lactación.
- No administrar a animales con historial conocido de hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.
- Pueden aparecer signos de dolor y vómitos si se administra a una velocidad de infusión excesivamente rápida. En tal caso, se debe suspender la administración hasta que desaparezcan los signos y entonces podrá reiniciarse la infusión de forma más lenta.

**Reacciones Adversas**
- Se puede manifestar con muy poca frecuencia reacciones de hipersensibilidad; si aparecieran, interrumpir el tratamiento.
- La reacción local (hinchazón) puede ocurrir en el lugar de la inyección en los animales hasta una semana después de la administración.
- Durante la administración intravenosa puede presentarse shock. En este caso se suspenderá la medicación y se tomarán las medidas apropiadas.

**Precauciones Específicas que Debe Tomar la Persona que Administre el Medicamento a los Animales**
- No manipular este producto si sabe que es sensible o si se le ha aconsejado no trabajar con tales preparaciones.
- Maneje este producto con gran cuidado para evitar la exposición, tomando todas las precauciones recomendadas.
- Si aparecen síntomas después de la exposición, como una erupción en la piel, debe buscar consejo médico y mostrar al médico esta advertencia. Hinchazón de la cara, labios u ojos o dificultad para respirar son síntomas más graves y requieren atención médica urgente.

**Interacciones**
No se han descrito.

**Sobredosificación**
Dada la inocuidad de sus componentes, resulta improbable que se produzca sobredosificación, aunque en tal caso se recomienda suspender la administración e instaurar el tratamiento sintomático oportuno.

**Advertencias**
- La administración debe realizarse a velocidad de infusión lenta y siguiendo las medidas de precaución asépticas normales para la administración de soluciones por vía parenteral.
- En el caso de la administración subcutánea, inyectar un máximo de 25 mL por punto de aplicación.
- En tratamientos prolongados, se recomienda realizar frecuentes controles del balance hidroelectrolítico.
- Agrovet Market S.A. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado en este inserto.

**Conservación**
Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. Almacenar entre 8ºC y 30ºC. No congelar. Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.

**Presentación comercial**
Frascos x 100 mL, 250 mL, 500 mL y 1 L.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO**
**SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

México: REGISTRO Q-0616-044
**Aminoforte®** es una marca registrada de Agrovet Market S.A.

Tel: (511) 2 300 300
Email: ventas@agrovetmarket.com
Web: www.agrovetmarket.com

**Elaborado por:** Pharmadix Corp. S.A.C. Calle Santa Lucía 220
Urb. Aurora- Ate, Lima-Perú Para: Agrovet Market S.A.
Av. Canadá 3792-3798, San Luís. Lima 30 - Perú

**Importado y Distribuido por:** Vetermex Animal Health S.A.
de C.V. Calle: La Brida # 247 Interior 1. Colonia: López Cotilla.
Tlaquepaque. Jalisco. México CP 45615.

42016MEX00001 V04.1021

Agrovet MARKET