

FICHA TÉCNICA

1. GENERALIDADES

1.1. **Nombre comercial** : TYLVAX® C Px

1.2. **Clase de uso** : Antibiótico

1.3. **Formulación** : Premezcla

2. COMPOSICIÓN

Cada 100 g de TYLVAX® C Px contiene:

Componente	Cantidad	Unidad
Tilvalosina (acetilisovaleriltilosina) como tartrato	2	g
Clortetraciclina (como clorhidrato)	20	g
Excipientes c.s.p.	100	g

3. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

3.1. **Aspecto:** Polvo homogéneo libre de impurezas visibles.

3.2. **Color:** Crema a amarillo.

4. DESCRIPCIÓN

TYLVAX® C Px es una asociación antibiótica para la medicación del alimento. Provee 20 mg/g de tilvalosina y 200 mg/g de clortetraciclina y es muy eficaz frente a enfermedades importantes en porcinos y aves (pollos de engorde y pavos). Posee acción contra microorganismos Gram positivos y Gram negativos y una excepcional actividad antimicoplásmica. La eficacia de la tilvalosina es hasta diez veces mayor que la tilosina y la asociación con una tetraciclina aumenta el efecto antibiótico, potenciando su acción y ampliando su espectro a infecciones mixtas.

5. INDICACIONES

Tratamiento de enfermedades respiratorias, entéricas, mixtas y/o complicadas causadas por microorganismos sensibles a la tilvalosina y/o a la clortetraciclina, principalmente:

Porcinos:

Micoplasmosis, neumonía micoplásmica (enzoótica) causada por *M. hyopneumoniae*, Enteropatía proliferativa Porcina (EPP), ileítis porcina causada por *Lawsonia intracellularis*,

Disentería porcina, causada por *Brachyspira hyodysenteriae*, colitis, causada por *Brachyspira pilosicoli*, rinitis atrófica, neumonías, pleuroneumonía porcina, enfermedad de Glässer, sinovitis infecciosa, enteritis necrótica e infecciosa de diversas patologías (salmonelosis, colibacilosis), Linfadenitis estreptocócica (abscesos cervicales) y abscesos de las articulaciones (*Staphylococcus spp*, *Corynebacterium spp*, *Streptococcus spp*). Infecciones bacterianas secundarias a virus o micoplasmosis.

En Pollos y Pavos:

Enfermedad respiratoria crónica (CRD), saculitis aérea y sinusitis infecciosa causadas por *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae* y *Mycoplasma meleagridis* (pavos). Enteritis necrótica asociada a *Clostridium perfringens*, enteritis bacterianas. ORT (*Ornithobacterium rhinotracheale*). Colisepticemia, coriza infecciosa, cólera aviar, neumonías, onfalitis, sinovitis infecciosa. Infecciones bacterianas secundarias a virus, coccidias (*Eimeria spp.*). Infecciones secundarias por *E. coli* asociadas a rinotraqueitis en pavos. Estrés o mortandad temprana por causas inespecíficas.

6. ESPECIES DE DESTINO

Aves (pollos de engorde y pavos) y porcinos.

7. ADMINISTRACIÓN

Vía oral mezclado en el alimento.

8. DOSIS

Porcinos: 250-400 g/100 kg alimento por 7-14 días. Aves: 250 g/100 kg alimento por 7-10 días. **Tylvax® C Px** deberá mezclarse con al menos el 5% de alimento a dosificar y luego ser incorporado a la totalidad del mismo. Administrar el alimento medicado como única ración durante los periodos recomendados. Consulte a su veterinario antes de iniciar cualquier tratamiento.

9. PRECAUCIONES

- No existen interacciones ni reacciones adversas conocidas.
- Evitar en animales con historial de hipersensibilidad.
- Cuando se mezcle el medicamento veterinario y manipule el alimento medicado, se debe evitar el contacto directo con ojos, piel y mucosas.
- Lavar manos y la piel expuesta después del uso.

agrovvetmarket.com

- En caso de contacto con los ojos, inmediatamente enjuagar con abundante agua. En caso de ingestión accidental o si aparecen síntomas, consulte inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.

10. CONTRAINDICACIONES

- Las personas con una conocida hipersensibilidad a los componentes deben evitar cualquier contacto con el producto.
- No ha quedado demostrada la seguridad durante la gestación y la lactancia en cerdas, usar de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo del veterinario responsable

11. PERIODO DE RETIRO

Carne: 5 días

No debe usarse en gallinas ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano.

12. ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar seco y bien ventilado, mantener fuera del alcance de los niños. Se recomienda utilizar todo el contenido una vez abierto y no almacenar bolsas abiertas. El alimento con el producto incorporado debería ser utilizado antes de los 30 días. Usar guantes y mascarillas al mezclar con el alimento.

13. PRESENTACIÓN

10, 20, 50, 100, 500 g, 1, 5, 10, 20, 25 kg.